

Échelle de Glasgow versus échelle d'AVPU

Développée en 1974 à l'Institut de neurologie de Glasgow, cette échelle indicatrice de l'état de conscience est maintenant connue mondialement. L'échelle de Glasgow, qui donne un score de 3 (coma profond) à 15 (alerte), permet d'établir une cote sur le niveau de conscience du patient.

Échelle de Glasgow standard (> cinq ans)	Échelle de Glasgow (de 2 à 5 ans)	Échelle de Glasgow (de 0 à 2 ans)
Ouverture des yeux	Ouverture des yeux	Ouverture des yeux
Spontanément 4	Spontanément 4	Spontanément 4
Aux stimuli verbaux 3	Aux stimuli verbaux 3	Lorsqu'il pleure 3
Aux stimuli douloureux 2	Aux stimuli douloureux 2	Aux stimuli douloureux 2
Aucune réponse 1	Aucune réponse 1	Aucune réponse 1
Réponse verbale	Réponse verbale	Réponse verbale
Est orienté et parle 5	Mots appropriés, sourit, fixe et suit du regard 5	Agit normalement 5
Est désorienté et parle 4	Mots inappropriés, pleure, est consolable 4	Pleure 4
Paroles inappropriées 3	Hurle, est inconsolable 3	Hurllements inappropriés 3
Sons incompréhensibles 2	Gémit aux stimuli douloureux 2	Gémissements (<i>grunting</i>) 2
Aucune réponse 1	Aucune réponse 1	Aucune réponse 1
Réponse motrice	Réponse motrice	Réponse motrice
Répond aux demandes 6	Répond aux demandes 6	Mouvements spontanés intentionnels 6
Localise la douleur 5	Localise la douleur 5	Se retire au toucher 5
Se retire à la douleur 4	Se retire à la douleur 4	Se retire à la douleur 4
Flexion à la douleur (décortication) 3	Flexion à la douleur (décortication) 3	Flexion anormale (décortication) 3
Extension à la douleur (décérébration) 2	Extension à la douleur (décérébration) 2	Extension anormale (décérébration) 2
Aucune réponse 1	Aucune réponse 1	Aucune réponse 1
Total (entre 3 et 15)	Total (entre 3 et 15)	Total (entre 3 et 15)

Elle permet ainsi de suivre l'évolution, à la hausse ou à la baisse, de l'état de conscience du patient. L'échelle est basée sur trois critères précis : **l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice.**

L'échelle AVPU permet, quant à elle, d'évaluer l'état de conscience du patient d'une manière moins précise, mais plus rapide.

A — Alert	Bien éveillé
V — Verbal	Répond aux ordres verbaux
P — Pain	Répond seulement à la douleur
U — Unresponsive	Aucune réponse